

- R. allegheniensis Porter
- R. alumnus Bailey
- R. arrheniiformis W.C.R.Watson
- R. axillaris Lej. & Court.
- R. bellardii Weihe
- R. bellobatus L.H.Bailey
- R. buhnensis (Focke) G.Braun
- R. calothyrsus A.Beek
- R. calviformis H.E.Weber
- R. calvus H.E.Weber
- R. calyculatus Kalt.
- R. ceratifolius A.Beek
- R. chlorothyrsos Focke
- R. commutatus G. Braun
- R. condensatus P.J.Müll
- R. conspicuus P.J.Müll.
- R. crassidens H.E.Weber
- R. dasyphyllus Rogers
- R. desarmatus A.Beek
- R. deweveri A.Beek
- R. edeesii H.E.Weber & Bull
- R. eifeliensis Wirtg.
- R. favillatus A.Beek
- R. foersteri Matzk.
- R. fuscus Weihe
- R. gelertii Frid.
- R. genevieri Boreau
- R. grabowskii Weihe
- R. grandiflorus Kalt.
- R. histriculus H.E.Weber
- R. horridus Schultz
- R. iceniensis A.Newton & H.E.Weber
- R. idaeoides nm. pseudo-caesius (Weihe) Sudre
- R. idaeoides Ruthe
- R. idaeus var. anomalus Arrh.
- R. incarnatus P.J.Müll.
- R. insularis Aresch.
- R. lasiocladus (Focke) Foerster
- R. latiarcuatus W.C.R.Watson
- R. leptothyrsos G.Braun
- R. libertianus Weihe ex. Lej. & Court.
- R. lindebergii P.J.Müll.
- R. longior A.Beek
- R. macer H.E.Weber
- R. magnisepalus Meijer
- R. melamporphyrus A.Beek
- R. mucronipetalus P.J.Müll.
- R. muenterii Marsson
- R. muridens A.Beek
- R. neanias A.Beek
- R. neerlandicus A.Beek

- R. odoratus var. albidus L.H. Bailey
- R. pallidus Weihe
- R. paludosus A.Beek
- R. perdemissus H.E.Weber
- R. pervirescens
- R. picearum (A.Beek) A.Beek
- R. praestans H.E.Weber
- R. procerus P.J.Müll.
- R. proiectus A.Beek
- R. rhytidophyllus H.E.Weber
- R. rotundatiformis Sudre
- R. schipperi A.Beek
- R. scidularum A.Beek
- R. scoliacanthus A.Beek
- R. spina-curva Boulay
- R. surrectus Meijer
- R. teretiusculus Kalt.
- R. tuberculatus Bab.
- R. umbrosus (Weihe & Nees) Arrh
- R. uncimontanus A.Beek & Troelstra
- R. vespicum Wirtg.
- R. vulgaris Weihe & Nees
- R. wittigianus H.E.Weber