

Ongetwijfeld waren zij dat rond de eeuwwisseling, toen zij in de winter in Hongarije talrijk voorkwamen, in Nederland ook al. Gesprekken met oude, ervaren ganzenvangers (o.a. E. Hoolwerf, geb. 1890, te Eemdijk; K. Dingsté, geb. 1891, te Dingstede, gemeente Staphorst en A. van Rossum, geb. 1893, te Alem) brachten aan het licht, dat Rietganzen van het Sushkin type, zij het uiterst zeldzaam, bij hun vangsten zijn voorgekomen; ook werden er volgens Hoolwerf soms wel eens meerdere tegelijk gevangen. Dat laatste is, in ieder geval sedert 1930, niet meer met zekerheid geconstateerd. De Nederlandse gegevens verschaffen dus nauwelijks enige bevestiging van de veronderstelling, dat de achteruitgang van Sushkins Ganzen in het hele continent heeft plaats gevonden.

SUMMARY

The occurrence of Sushkin's Bean Geese *Anser fabalis "neglectus"* Sushkin in The Netherlands is discussed following up a recent note by Van Impe (1971). Extensive ringing activities of the *Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN)* have revealed 8 or 10 specimens, which is ca. 0.1% of a total of ca. 7250 Bean Geese caught between the winter seasons of 1954-55 and 1971-72, and making a total of 10—12 Sushkin's Geese at present known from The Netherlands. Four of these were of the slender-billed western Forest Goose type *A.f. fabalis* (Fig. 1), two of the intermediate type between *fabalis* and the tundra-inhabiting *rossicus* (the intermediate type is the most frequent of the Bean Goose forms wintering in The Netherlands) and one resembling the more heavily billed western Siberian Forest Bean Goose *A. fabalis johanseni*; the shape of the bill in the remaining ones being unknown. Approximately as many birds are known which had the bill pink-coloured and the legs yellow or orange-yellow, as in "normal" Bean Geese, suffused with a trace of pink of slightly different intensities.

Sushkin's Bean Geese are considered colour anomalies which may occur in any of the west palaearctic races of *Anser fabalis*.

LITERATUUR

- Brink, H. F. van den. 1930. Sushkin's Rietgans, *Anser neglectus* Sushkin, in Nederland. Org. Cl. Ned. Vogelk. 3: 6—12.
 Impe, J. van. 1971. Een Sushkins Gans *Anser neglectus* nabij de Grote Peel. Limosa 44: 102—104.
 Voous, K. H. 1963. Een Sushkins Gans uit Nederland. Limosa 36: 149—151.

Adres: K. H. Voous;
 Biologisch Laboratorium, Vrije Universiteit, Amsterdam
 "Zoölogisch Museum", Universiteit van Amsterdam