

Quelquefois les taches disparaissent en partie. M. Gené m'a communiqué un individu de Sardaigne, n'ayant plus qu'une petite tache postérieure sur les 4 et 5^e, le 6^e seul couvert, tout le reste rouge; dernier segment, chez la femelle, entièrement fendu en dessus; ptérostigma en losange, plus pâle à la circonférence chez celle-ci.

Commun en France le long des étangs, des marécages, depuis le printemps jusqu'en automne. Habite aussi la Sicile, etc.

29. AGRION FERRUGINEUM, *miki*.

Ferrugineum; abdomine postice infuscato; segmenti ultimi margine postico emarginato, appendicibus superioribus brevioribus inferne curvis, submucronatis, posticis suberectis, ante apicem infra gibbosis.

Ressemblant beaucoup au *Cerinum*, mais un peu plus grand. D'un rouge ferrugineux qui doit être très-vif pendant la vie. Tête ayant la face jaune un peu obscure en dessus. Thorax un peu obscur en dessus, avec l'apparence de bandes plus foncées. Abdomen long, un peu plus pâle en dessous, ayant les derniers segments un peu obscurs; dernier échancré avec les angles de l'échancrure denticulés; appendices différant beaucoup de ceux du *Rubellum* et du *Cerinum*: les supérieurs plus courts, arrondis supérieurement, courbés vers les inférieurs, terminés par une petite pointe, paraissant plutôt concaves inférieurement et convexes supérieurement; les postérieurs un peu redressés vers les supérieurs, au-dessus desquels ils se terminent en une pointe un peu obtuse, au-dessous de laquelle se voit une saillie assez forte. Pattes d'un jaune roux. Ailes un peu jaunâtres; ptérostigma en losange allongé, d'un brun roussâtre.

De Madagascar. M. Guérin m'a communiqué plusieurs individus, chez lesquels les appendices inférieurs sont un peu plus longs, un peu plus larges, ayant la pointe de l'extrémité un peu plus allongée. La femelle semblable au mâle, mais un peu plus pâle.

30. AGRION CAPILLARE, *miki*.

Gracillimum; thorace cyaneo supra obscure violaceo-caruleo; abdominis segmento secundo supra violaceo, nitido, tertio obscure subviolaceo, macula magna pallide viridi-azurea ♂.

Plus petit que le *Pumilio* et extrêmement grêle, surtout l'abdomen (chez le seul individu mâle que j'ai sous les yeux la tête et l'extrémité de l'abdomen manquent). Thorax paraissant azuré pendant la vie, ayant le dessus d'un brun violet obscur, couleur qui aux extrémités descend un peu sur les bords, et sur les côtés une bande de la même couleur, qui les traverse dans leur longueur. Abdomen capillaire, d'un brun vio-

lacé; second segment d'un bleu violet foncé en dessus, le troisième ayant une grande tache occupant plus du tiers, d'un vert bleu pâle, les suivants ayant seulement une petite bande circulaire à la base. Ailes transparentes avec le ptérostigma noir, un peu en losange, presque carré.

31. AGRION ANOMALUM, *miki*.

Minimum, flavo viridi-aneoque variegatum; abdominis segmento ultimo appendice apice furcato, appendicibus analibus superioribus brevioribus furcatis; alis anticis pterostigmate marginem non attingente ♂.

Un des plus petits du genre, ayant deux centim. et demi d'envergure. Dessus de la tête d'un bleu obscur bronzé avec deux points postérieurs un peu allongés longitudinalement, jaunâtres. Thorax jaune ayant le dessus d'un vert bronzé avec deux lignes jaunes. Abdomen jaune avec des taches en dessus d'un vert bronzé violâtre ainsi disposées: celle des deux premiers segments les couvrant entièrement, celle du troisième, d'abord large, puis s'amincissant jusqu'aux trois quarts du segment et se dilatait après en forme de tête, celle des suivants ayant la même forme, mais plus étroite et même interrompue avant la dilatation; celle du septième couvrant les deux tiers antérieurs, les autres sans taches; dernier segment tronqué ou échancré en dessus à son bord postérieur qui présente un appendice fourchu à l'extrémité, sur les côtés duquel le bord est rabattu; appendices supérieurs courts, fourchus; les inférieurs plus longs, grêles, un peu en forme de pince, pointus. Pattes jaunes. Ailes transparentes; ptérostigma des premières séparé de la nervure costale par une large aréole ovalaire, peu coloré en roussâtre, plus foncé au milieu; celui des inférieures plus petit, plus foncé, un peu en losange, touchant la nervure costale.

Cette curieuse espèce appartient à M. Serville, et est indiquée de Cuba.

GENRE MECISTOGASTER, *miki*.

Tête ayant les yeux assez éloignés l'un de l'autre; lèvres inférieure étroite, divisée très-profondément ou jusqu'au milieu en deux parties étroites, droites, un peu pointues; second article des palpes labiaux plus large qu'elle, plus court, prolongé à son angle interne en une forte épine, troisième étroit, cylindrique, moitié plus court. Abdomen souvent plus étendu que l'envergure des ailes. Appendices supérieurs (je ne les connais que dans trois espèces) assez grands, en forme de pince, les inférieurs presque nuls. Ailes pédicellées, ayant la plus grande partie des aréoles qua-