

Euraziatische Rode Eekhoorn – *Sciurus vulgaris*

Uiterlijk:

Kopromp: 21-25 cm

Staart : 14-22 cm

Gewicht : 230-415 gram

Kleed : Zeer variabel van roodbruin en grijsachtig tot geheel zwart met witte buik in combinatie met pluimstaart en in de winter oorpluimen.

Leefwijze:

- dagactief
- geen winterslaap

Habitat:

- Gemengd-, loof- en naaldbos
- Naaldbomen >20 jaar, Beuken >80 jaar, Eiken >40 jaar
- Tuinen en parken
- Houtwallen

Roodbruine vorm

<http://observado.org/fotonew/2/1304542.jpg>

<http://observado.org/fotonew/8/3267288.jpg>

<http://waarneming.nl/fotonew/4/3148284.jpg>

<http://waarneming.nl/fotonew/3/296563.jpg>

Zwarte vorm

<http://observado.org/fotonew/8/2769438.jpg>

<http://observado.org/fotonew/3/2003133.jpg>

Grijze vorm

<http://waarneming.nl/fotonew/6/109186.jpg>

<http://waarneming.nl/fotonew/6/989316.jpg>

Japanse Eekhoorn – Sciurus lis

Uiterlijk:

Kopromp: 18-25 cm

Staart : 14-20 cm

Gewicht : 230-415 gram

Kleed : Zeer variabel van roodbruin en grijsachtig tot geheel zwart met witte buik in combinatie met pluimstaart en in de winter oorpluimen.

Let op: Alleen de bonte kweekvormen van deze soort zijn dusdanig in het veld als Japanse Eekhoorn te herkennen. Verder kan alleen DNA-onderzoek de soort op naam brengen.

http://www.hgrouve.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=77

Leefwijze:

- dagactief
- geen winterslaap

Habitat:

- Gemengd-, loof- en naaldbos
- Naaldbomen >20 jaar, Beuken >80 jaar, Eiken >40 jaar
- Tuinen en parken
- Houtwallen

Bonte kweekvorm:

<http://waarneming.nl/fotonew/3/3499173.jpg>

Noord-Amerikaanse Grijze Eekhoorn – *Sciurus carolinensis*

Uiterlijk:

Kopromp: 23-28 cm

Staart : 20-24 cm

Gewicht : 510-750 gram

Kleed : Grijs kleed met rossige flanken, kop, poten en staart in combinatie met witte buik. Deze soort heeft nooit oorpluimen. Let op: sommige populaties betreffen geheel zwarte Grijze Eekhoorns.

Leefwijze:

- dagactief
- geen winterslaap
- minder schuw dan zijn inheemse soortgenoot en kan in grotere dichtheden voorkomen.

Habitat:

- Vooral gemengd- en loofbos, legt het in naaldbos af tegen de Euraziatische Rode Eekhoorn.
- Tuinen en parken
- Houtwallen

Nominaatvorm:

<http://observado.org/fotonew/1/1732101.jpg>

<http://observado.org/fotonew/6/1732106.jpg>

<http://observado.org/fotonew/4/3252554.jpg>

Tussenvorm:

<http://observado.org/fotonew/2/705962.jpg>

Zwarte melanistische vorm:

<http://observado.org/fotonew/6/1410326.jpg>

Amerikaanse Rode Eekhoorn – Tamiasciurus hudsonicus

Uiterlijk:

Kopromp: 18-21 cm

Staart : 10-15 cm

Gewicht : 200-250 gram

Kleed : Rossig en grijs kleed, witte buik, kleine oorpluimpen en karakteristieke witte oogring

Leefwijze:

- dagactief

- geen winterslaap

Habitat:

- Naald- en gemengdbos

- Tuinen en parken

<http://observado.org/fotonew/4/932224.jpg>

<http://waarneming.nl/fotonew/4/3034364.jpg>

<http://waarneming.nl/fotonew/5/2188955.jpg>

Pallas'Eekhoorn – Callosciurus erythraeus

Uiterlijk:

Kopromp: vergelijkbaar met rode

Staart : vergelijkbaar met rode

Gewicht : 280-420 gram

Kleed : Olijfbroine rug; 'bruin'rode tot geeloranje buik; grijze kin, nek, poten en voeten en geen oorpluimen

Leefwijze:

- dagactief

- geen winterslaap

Habitat:

- Naald-, loof-, en gemengdbos

- Tuinen en parken

<http://waarneming.nl/fotonew/8/1779118.jpg>

<http://waarneming.nl/fotonew/9/1827419.jpg>

<http://waarneming.nl/fotonew/3/2702943.jpg>

Siberische Grondeekhoorn – Tamius sibiricus

Uiterlijk:

Kopromp: 12-17 cm

Staart : 8-12 cm

Gewicht : 50-120 gram

Kleed : Vijf zwartbruine lengtestrepen over rug en flanken; bruinigrijze met oker- of zandkleurige rug; witgrijze buik; geen oorpluimen. Ook enkele kleurvormen.

Leefwijze:

- dagactief

- winterslaap: oktober/november – februari/maart

Habitat:

- Naald-, loof-, en gemengdbos

- Tuinen en parken

Nominaat:

<http://waarneming.nl/fotonew/6/3124496.jpg>

<http://waarneming.nl/fotonew/6/3086346.jpg>

<http://waarneming.nl/fotonew/6/3033526.jpg>

Witte kweekvorm:

<http://waarneming.nl/fotonew/6/907066.jpg>